# NCGM COVID-19 治療フローチャート（中等症以上成人）

2022 年 3 月 22 日 第 5 版作成




| 薬剤名 | 投与量 | 投与期間 | 使用注意 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| レムデシビル（ベクルリー®） | 初回 200mg 1 日 1 回<br>翌日以降 100mg 1 日 1 回 | 中等症以上では 5～10 日間 | ① eGFR< 30mL/min<br>② ALT が正常上限の 5 倍以上 | 5 日間で臨床症状の改善を認めなければ 10 日間まで投与延長可 |
| デキサメタゾン | 経口・経管 デカドロン錠®4mg 1.5 錠 1 日 1 回<br>経 静 脈 デキサート注射液®6.6mg 1 筒 1 日 1 回 | 7～10 日間（酸素需要が消失したら終了可） | ① 活動性消化管出血<br>② 本薬剤にアレルギーあり | 40kg 未満では 0.15mg/kg/日に減量。妊婦・授乳婦にはプレドニゾロン 40mg/日で代用。高体重に高用量メチルプレドニゾロン（1-2mg/kg/day）、重症例にパルス療法も行われている。 |
| トシリズマブ（アクテムラ®） | 8mg/kg（上限 800mg）を静注 1 日 1 回 | 1 日間 | ① 活動性肺結核の可能性がある<br>② ALT が正常上限の 5 倍以上<br>③ 好中球数＜500/mm$^3$ ④ リンパ球数＜500/mm$^3$<br>⑤ 血小板数＜5 万/mm$^3$ | 投与前に結核、非結核性抗酸菌症、B 型肝炎のスクリーニングを実施（胸部画像検査、QFT/T-SPOT、HBs 抗原・HBs 抗体・HBc 抗体） |
| バリシチニブ（オルミエント®） | 4mg を 1 日 1 回内服<br>30≦eGFR＜60 の場合は 2mg に減量 | 最大 14 日間 | | |